
DM1 vB

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note f_n la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$f_n : x \mapsto x^{2n+1} - x^{n+1} - 1$$

1. Étudier les variations de la fonction f_n sur \mathbb{R}_+ .
2. **a)** Montrer que la fonction f_n s'annule une unique fois sur \mathbb{R}_+ .
On note x_n l'unique solution de l'équation $f_n(x) = 0$.
b) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n > 1$.
3. **a)** Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.
b) Que peut-on en conclure ?
4. On note h la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par :

$$h : x \mapsto x(x - 1)$$

Montrer que la fonction h réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

5. **a) (i)** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer $(x_n)^n$ en fonction de h^{-1} .
(ii) En déduire que la suite $((x_n)^n)_{n \geq 1}$ converge.
b) Montrer alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.
Indication : on pourra procéder par l'absurde.
c) En déduire : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n = \varphi$, où φ est l'unique solution de l'équation $h(x) = 1$ sur $[1, +\infty[$.
6. **a)** Déterminer un équivalent de $(\ln(x_n))$.
b) En déduire : $x_n - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(\varphi)}{n}$.