

## DS7 (version B)

Ce problème est constitué de trois parties. Les résultats de la partie 1 sont utilisés dans les parties 2 et 3. Les parties 2 et 3 sont indépendantes entre elles.

Dans tout le sujet,  $I = ]a, b[$  est un intervalle ouvert non vide de  $\mathbb{R}$ , où  $a$  et  $b$  sont réels ou infinis.

On dit qu'une densité vérifie l'hypothèse CSP( $I$ ) lorsque  $f$  est :

- × continue sur  $I$  ;
- × strictement positive sur  $I$  ;
- × nulle en dehors de  $I$ .

On écrira alors simplement :  $f$  est CSP( $I$ ).

On admettra que les principaux résultats du cours concernant l'indépendance des variables aléatoires discrètes s'appliquent également aux variables aléatoires à densité.

### Partie 1 - Calcul d'une probabilité

On considère dans cette partie :

- ×  $X$  une variable aléatoire réelle continue à valeurs dans  $I$ , de fonction de répartition  $F$  et admettant une densité de probabilité  $f$  qui est CSP( $I$ ).
- ×  $U$  une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur  $]0, 1[$  et qui est indépendante de  $X$ .
- ×  $h$  une fonction continue sur  $I$  à valeurs dans  $[0, 1]$ .

On se propose d'établir la formule suivante :

$$\mathbb{P}([U \leq h(X)]) = \mathbb{P}([U < h(X)]) = \int_a^b f(t) h(t) dt$$

On définit sur  $I$  la fonction  $\Psi$  par :  $\Psi(x) = \mathbb{P}([X \leq x] \cap [U \leq h(X)])$ .

1. Pour tous réels  $x$  et  $y$  dans  $I$  tels que  $x < y$ , on pose  $M(x, y) = \max_{t \in [x, y]} h(t)$  et  $m(x, y) = \min_{t \in [x, y]} h(t)$ .

a) Soit  $x$  dans  $I$ . Justifier que pour tout  $y$  dans l'intervalle  $]x, b[$ , il existe  $\alpha_y$  dans l'intervalle  $[x, y]$  tel que  $M(x, y) = h(\alpha_y)$ .

b) En déduire :  $\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y > x}} M(x, y) = h(x)$ .

c) Montrer de même que, pour tout  $y$  dans  $I$  :  $\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x < y}} M(x, y) = h(y)$ .

On montrerait de manière analogue (on ne demande pas de le vérifier) :

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y > x}} m(x, y) = h(x) \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x < y}} m(x, y) = h(y)$$

2. Soit  $x$  et  $y$  deux réels de  $I$  tels que  $x < y$ .

a) Établir l'inclusion suivante entre évènements :

$$[x < X \leq y] \cap [U \leq h(X)] \subset [x < X \leq y] \cap [U \leq M(x, y)]$$

En déduire l'inégalité :

$$\Psi(y) - \Psi(x) \leq (F(y) - F(x)) M(x, y)$$

b) Établir une minoration analogue pour  $\Psi(y) - \Psi(x)$ , puis l'encadrement :

$$\frac{F(y) - F(x)}{y - x} m(x, y) \leq \frac{\Psi(y) - \Psi(x)}{y - x} \leq \frac{F(y) - F(x)}{y - x} M(x, y)$$

c) Montrer que  $\Psi$  est dérivable sur  $I$ , et exprimer sa dérivée en fonction de  $f$  et  $h$ .

3. a) En déduire que, pour tout  $x$  et  $y$  dans  $I$  :

$$\Psi(y) - \Psi(x) = \int_x^y f(t) h(t) dt$$

b) Établir : pour tout  $x$  dans  $I$ ,  $\Psi(x) \leq F(x)$ , puis montrer :  $\lim_{x \rightarrow a} \Psi(x) = 0$ . En déduire :

$$\forall x \in I, \quad \Psi(x) = \int_a^x f(t) h(t) dt$$

c) Établir, pour tout  $x$  dans  $I$  :  $\mathbb{P}([X > x] \cap [U \leq h(X)]) = \mathbb{P}([U \leq h(X)]) - \Psi(x)$ .  
 En déduire :  $\lim_{x \rightarrow b} \Psi(x) = \mathbb{P}([U \leq h(X)])$  puis :

$$\mathbb{P}([U \leq h(X)]) = \int_a^b f(t) h(t) dt$$

4. Montrer :  $\mathbb{P}([U < h(X)]) = 1 - \mathbb{P}([1 - U \leq 1 - h(X)])$ , en déduire :

$$\mathbb{P}([U < h(X)]) = \int_a^b f(t) h(t) dt$$

## Partie 2 - Le modèle économique de Leontiev fermé

Soit  $\alpha$  et  $\beta$  deux nombres réels appartenant à l'intervalle  $]0, 1[$ .

On s'intéresse à un modèle économique composé de trois secteurs d'activité  $S_1$ ,  $S_2$  et  $S_3$ .

On suppose que :

- × pour produire une unité de biens du secteur 1, il faut  $\alpha$  unités du secteur 1 et  $\alpha$  unités du secteur 2.
- × pour produire une unité de biens du secteur 2, il faut  $\beta$  unités du secteur 1 et  $\alpha$  unités du secteur 3.
- × pour produire une unité de biens du secteur 3, il faut  $\beta$  unités du secteur 2 et  $\beta$  unités du secteur 3.

On dira que ce modèle est *viable* s'il existe des quantités de productions  $x_1$ ,  $x_2$  et  $x_3$  des secteurs respectifs  $S_1$ ,  $S_2$  et  $S_3$ , strictement positives et telles que chaque secteur soit excédentaire en quantité.

5. a) Montrer que le modèle est viable si et seulement s'il existe  $x_1 > 0$ ,  $x_2 > 0$ ,  $x_3 > 0$ , tels que :

$$\begin{cases} x_1 > \alpha x_1 + \beta x_2 \\ x_2 > \alpha x_1 + \beta x_3 \\ x_3 > \alpha x_2 + \beta x_3 \end{cases}$$

b) On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & \beta \end{pmatrix}$ . Montrer que le modèle est viable si et seulement s'il existe une matrice colonne  $X$  à composantes strictement positives telle que la matrice colonne  $X - AX$  n'a que des composantes strictement positives.

6. a) Vérifier que  $\alpha + \beta$  est valeur propre de  $A$  et déterminer le sous espace vectoriel associé.  
b) En déduire que si  $\alpha + \beta < 1$ , alors le modèle est viable.  
On admet pour la suite que le modèle est viable si et seulement si le spectre de  $A$  est inclus dans  $] - 1, 1[$ .
7. a) Montrer que le modèle est viable si et seulement si  $\alpha + \beta < 1$ .  
b) Déterminer les valeurs propres de  $A$  autres que  $\alpha + \beta$ , et vérifier qu'elles sont dans l'intervalle  $] - 1, 1[$ .
8. On suppose, dans cette question seulement, que  $\alpha$  est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur  $]0, 1[$  et que  $\beta$  est une variable aléatoire à valeurs dans  $]0, 1[$ , admettant une densité de probabilité  $f$  qui est CSP( $]0, 1[$ ).  
En utilisant les résultats de la **Partie 1**, montrer que la probabilité que le modèle soit viable vaut  $1 - \mathbb{E}(\beta)$ .
9. On suppose désormais que  $\alpha$  et  $\beta$  sont tels que le modèle est viable. Pour  $i = 1, 2$  ou  $3$ , on note  $y_i$  le coût de production d'une unité de bien dans le secteur  $i$ , et  $y_i + z_i$ , le prix de vente d'une unité de bien du secteur  $i$ . La marge  $z_i$  est appliquée uniquement en cas de vente à un autre secteur, l'achat à l'intérieur d'un même secteur se faisant au prix coûtant  $y_i$ .  
On définit les deux matrices lignes :  $Y = (y_1 \ y_2 \ y_3)$  et  $Z = (z_1 \ z_2 \ z_3)$  ainsi que la matrice carrée  $B = \begin{pmatrix} 0 & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & 0 \end{pmatrix}$ .
- a) Établir la relation matricielle (1) :  $Y = Y A + Z B$ .  
b) Justifier sans calculs l'inversibilité de  $I_3 - A$ .  
En déduire que pour  $Z$  fixé, il existe un unique  $Y$  vérifiant la relation (1).

### Partie 3 - Simulation de variables aléatoires

La plupart des langages informatiques possèdent un générateur de nombres aléatoires. En **Scilab** par exemple, on dispose de la fonction `rand`. Cette fonction simule une v.a.r. de loi uniforme sur  $]0, 1[$ .

On propose dans la suite deux méthodes permettant de simuler des lois continues quelconques en utilisant ce générateur aléatoire.

**Jusqu'à la fin du problème** : on note  $Z$  une variable aléatoire continue à valeurs dans  $I$ , de fonction de répartition  $G$  et admettant une densité  $g$  qui est CSP( $I$ ).

#### A - Simulation par la méthode d'inversion

10. a) On note  $H$  la restriction de  $G$  à  $I$ . Montrer que  $H$  réalise une bijection de  $I$  sur  $]0, 1[$ .  
On note  $H^{-1}$  la bijection réciproque. Dresser le tableau de variation de  $H^{-1}$ .  
Soit  $U$  une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur  $]0, 1[$ .  
On pose  $X = H^{-1}(U)$ , et on note  $F$  la fonction de répartition de  $X$ .
- b) Montrer que pour tout  $x$  dans  $I$ ,  $F(x) = G(x)$ .  
c) En déduire que  $X$  suit la même loi que  $Z$ .

11. Simulation de lois exponentielles.

On suppose dans cette question que  $Z$  suit une loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ .

a) Expliciter l'intervalle  $I$  et les fonctions  $g$ ,  $G$  et  $H^{-1}$ .

b) Écrire une fonction **Scilab** d'en-tête `function z = expo(lambda)` qui simule la loi exponentielle de paramètre `lambda`.

12. Simulation de la loi de Laplace.

On cherche dans cette question à simuler une variable aléatoire de densité  $g$  donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|} \quad (\text{densité de Laplace})$$

Soit  $Y$  une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre 1.

Soit  $V$  une variable aléatoire indépendante de  $Y$  suivant la loi uniforme sur  $\{-1, 1\}$ , ce qui signifie

$$\mathbb{P}([V = -1]) = \mathbb{P}([V = 1]) = \frac{1}{2}.$$

On pose  $X = VY$ .

a) Vérifier que  $g$  est une densité de probabilité qui est CSP( $\mathbb{R}$ ).

b) Établir :

$$\times \text{ pour tout } x \geq 0, \mathbb{P}([X > x]) = \frac{1}{2} \mathbb{P}([Y > x]);$$

$$\times \text{ pour tout } x \leq 0, \mathbb{P}([X \leq x]) = \frac{1}{2} \mathbb{P}([Y \geq -x]);$$

c) En déduire une expression de la fonction de répartition de  $X$ .

d) Conclure que  $X$  est une variable aléatoire continue admettant  $g$  comme densité.

e) Compléter la fonction **Scilab** suivante pour qu'elle simule la loi de Laplace :

```

1  function z = laplace()
2      y = expo(1)
3      v = rand()
4      if ... then
5          z = y
6      else
7          z = ...
8      end
9  endfunction

```

## B - Simulation par la méthode du rejet

Dans la méthode dite du rejet, pour simuler la loi de  $Z$  de densité  $g$  (voir les notations en préambule de la **Partie 3**), on commence par déterminer une loi de probabilité que l'on sait simuler, de densité  $f$  qui est CSP( $I$ ), et qui vérifie : il existe une constante  $c > 0$  telle que :  $\forall x \in I, g(x) \leq c f(x)$ .

13. Montrer qu'il existe une fonction  $h$  continue sur  $I$  et à valeurs dans  $[0, 1]$  telle que, pour tout  $x \in I$ ,  $g(x) = c f(x) h(x)$ .

On considère alors :

$\times$  une suite de variable aléatoires  $(U_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  qui suivent une loi uniforme sur  $]0, 1[$ .

$\times$  une suite de variable aléatoires  $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  à valeur dans  $]a, b[$  ayant toutes la même loi, de densité de probabilité  $f$  et de fonction de répartition  $F$ .

On suppose de plus que pour tout entier  $n \geq 1$ , les variables  $X_1, \dots, X_n, U_1, \dots, U_n$  sont mutuellement indépendantes.

On définit  $N$  la variable aléatoire prenant comme valeur le premier indice  $k$  vérifiant  $U_k \leq h(X_k)$ .

14. En utilisant la **Partie 1**, prouver l'égalité, pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$  :  $\mathbb{P}([U_k \leq h(X_k)]) = \frac{1}{c}$ .

En déduire que  $N$  suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre, l'espérance et la variance.

On définit la variable aléatoire  $X$  comme étant la valeur de  $X_N$ , c'est à dire la valeur de  $X_k$  pour le premier indice  $k$  vérifiant  $U_k \leq h(X_k)$ .

15. Soit  $x \in I$ .

a) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Exprimer l'événement  $[X \leq x] \cap [N = n]$  à partir des événements  $[X_n \leq x] \cap [U_n \leq h(X_n)]$  et  $[U_k > h(X_k)]$  pour  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ .

b) En utilisant la question **3.b**), montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$\mathbb{P}([X_n \leq x] \cap [U_n \leq h(X_n)]) = \frac{1}{c} G(x)$$

c) En déduire  $\mathbb{P}([X_n \leq x] \cap [N = n])$  en fonction de  $c$  et de  $G(x)$ .

d) Montrer finalement :  $\mathbb{P}([X \leq x]) = G(x)$ .

16. Conclure.

17. Simulation de la loi normale.

Dans cette question,  $Z$  suit la loi normale centrée réduite, donc  $I = \mathbb{R}$ .

Soit  $f$  la densité de Laplace (question **12.**), définie par :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ .

a) Donner une densité  $g$  de  $Z$  qui est CSP( $\mathbb{R}$ ).

b) Étudier les variations sur  $[0, +\infty[$  de la fonction  $a : x \mapsto e^{x - \frac{x^2}{2}}$ .

c) Expliciter une constante  $c > 0$  telle que, pour tout  $x \geq 0$  :  $g(x) \leq \frac{c}{2}e^{-x}$ .

d) En déduire, pour tout  $x$  réel :  $g(x) \leq cf(x)$ .

e) Expliquer alors comment mettre en place la méthode du rejet pour simuler la loi normale centrée réduite. On explicitera la fonction  $h$  introduite à la question **13**.

f) Compléter la fonction **Scilab** suivante pour qu'elle simule la loi normale centrée réduite :

```

1  function z = normale()
2      x = laplace()
3      u = rand()
4      while ...
5          x = laplace()
6          u = rand()
7      end
8      z = ...
9  endfunction

```